

DROGUES À 17 ANS : ÉTAT DES LIEUX 2008, ÉVOLUTIONS DEPUIS 2000

Résultats de la sixième enquête ESCAPAD menée auprès de quelque 40 000 jeunes gens en métropole

L'Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT) a interrogé en 2008 les jeunes Français présents lors de la JAPD (Journée d'Appel de Préparation à la Défense) sur leur santé et leurs consommations de produits psychoactifs.

Cette sixième Enquête sur la Santé et les Consommations lors de l'Appel de Préparation À la Défense (ESCAPAD), réalisée comme les précédentes avec le soutien de la Direction du Service National, a porté sur un échantillon de 39 542 jeunes âgés de 17 ans en métropole.

Les premiers résultats, publiés dans le numéro 66 de *Tendances*¹, présentent les niveaux d'usages² d'une quinzaine de substances. Il s'agit d'abord, des produits les plus diffusés, alcool et tabac, et, pour les drogues illicites, du cannabis. D'autres substances, illicites (cocaïne, drogues de synthèse, etc.) ou détournées de leur usage, et dont la consommation est plus rare sont également étudiées. Cette synthèse est par ailleurs l'occasion de réactualiser les évolutions de ces consommations depuis 2000.

Les dernières tendances pour ces deux groupes de produits se révèlent très différentes : **stabilité voire baisse pour les trois produits les plus diffusés alors que le groupe des produits illicites ou détournés, moins répandus, voit leur diffusion se développer.**

Alcool tabac et cannabis

Alcool, tabac et cannabis sont les trois produits les plus diffusés. Les garçons sont toujours plus concernés que les filles par ces consommations, hormis pour le tabagisme dont les niveaux d'usage sont équivalents. Globalement les usages de ces produits apparaissent en recul même si la tendance est moins nette pour les ivresses.

- ***Des niveaux d'expérimentation en baisse excepté pour les ivresses***

En 2008, plus de 9 jeunes sur 10 de 17 ans (92,6 %) déclarent avoir déjà bu de l'alcool. Sept sur dix (70,7 %) indiquent avoir déjà fumé une cigarette. Ils sont près de six sur dix (59,8 %) à avoir déjà été ivres et un peu plus de quatre sur dix (42,2 %) à avoir déjà fumé du cannabis au cours de leur vie. La plupart de ces niveaux sont en repli. L'expérimentation de tabac est en baisse depuis 2000 et celle de cannabis depuis 2003 ; l'usage d'alcool au cours de la vie, après avoir baissé en 2003 s'est stabilisé depuis, alors que celui de l'ivresse est orienté à la hausse depuis 2003.

En 2008, l'âge moyen lors de la 1^{ère} cigarette se situe autour de 13 ans et demi ; celui de la 1^{ère} ivresse est un peu plus élevé : 15 ans. Le 1^{er} usage de cannabis, lorsqu'il intervient, se situe à peine plus tard : juste après 15 ans. Depuis 2000, les âges moyens lors des expérimentations de tabac et

¹ Les drogues à 17 ans Résultats de l'enquête ESCAPAD 2008. Stéphane Legleye, Stanislas Spilka, Olivier Le Nézet, Cécile Laffiteau.

² voir définitions page 2

de cannabis ont connu des évolutions similaires: diminution jusqu'en 2005 puis augmentation jusqu'en 2008 et ce parallèlement pour les deux sexes.

- *Usages réguliers et quotidiens en recul*

Les usages réguliers des substances les plus diffusées sont eux aussi orientés à la baisse au moins sur la période la plus récente. Après avoir augmenté jusqu'en 2003, l'alcool est en recul depuis. Pour les ivresses régulières les niveaux sur l'ensemble de la période passent de 6,4 % à 8,6 % mais le pic se situait en 2005 à 9,7 %. La consommation quotidienne de tabac marque pour sa part très nettement le pas : un peu plus de 4 jeunes sur dix (41,1 %) déclaraient fumer tous les jours en 2000 : ils sont un peu moins de trois sur dix (28,9 %) en 2008, soit une baisse sur l'ensemble de la période de 30 %. Quant aux consommations régulières ou quotidiennes de cannabis, elles suivent également un mouvement descendant continu depuis 2002. Elles sont ainsi passées respectivement de 12,3 à 7,3 % et de 4,5 à 3,2 %.

Cocaine, amphétamines, ecstasy, héroïne et autres produits psychoactifs illicites

Même s'ils restent très inférieurs aux chiffres précédents et que les évolutions pour la douzaine de produits interrogés sont contrastées, les niveaux d'expérimentation des substances psychoactives illicites autres que le cannabis ont globalement augmenté entre 2000 et 2008. Là encore, les garçons sont toujours plus concernés que les filles par les usages. L'âge d'expérimentation de ces produits a d'abord crû entre 2000 et 2003 pour rester stable ensuite, aux alentours de 16 ans, ce qui montre que ces expérimentations ne sont pas plus précoces qu'auparavant malgré l'accentuation de leur diffusion dans la population adolescente.

- *Expérimentation des produits stimulants en hausse*

Du côté des stimulants, on note une progression continue de la cocaïne (3,3 % d'expérimentation au lieu de 2,5 % en 2005 ; le niveau de 2000 était de 0,9 %). Beaucoup plus rare, le crack est néanmoins lui aussi en hausse passant de 0,7 % à 1,0 % entre 2005 et 2008. Les amphétamines sont également en augmentation passant de 2,2 à 2,7 % entre 2005 et 2008. Le seul léger recul porte sur l'expérimentation d'ecstasy qui se situe à 2,9 % contre 3,5 % en 2005.

- *Diffusion des substances rares en augmentation*

Dans le groupe des produits les plus rares, plusieurs connaissent des augmentations de leur diffusion. Ainsi l'héroïne franchit le seuil de 1 % d'expérimentation (1,1 contre 0,7 % en 2005) ; le GHB progresse de 0,3 à 0,4 % et la Kétamine de 0,4 à 0,6 % entre 2005 et 2008. L'expérimentation du LSD passe de 1,1 à 1,2 % tandis que celle du Subutex® est pour les deux années de 0,5 %.

- *Forte hausse des produits à inhaler et des poppers*

L'enquête ESCAPAD 2008 met en lumière une très forte augmentation de l'expérimentation des inhalants, c'est le cas notamment des poppers depuis 2002 et surtout depuis 2005 (leur usage au cours de la vie passe de 5,5 en 2005 à 13,7 % en 2008).

Les principaux indicateurs utilisés dans l'enquête ESCAPAD sont les suivants.

L'expérimentation désigne le fait d'avoir déjà consommé un produit au moins une fois au cours de sa vie. A l'exception des ivresses régulières (au moins dix épisodes au cours des douze derniers mois), les autres indicateurs se réfèrent aux trente derniers jours : usage quotidien de tabac ou de cannabis (au moins une cigarette par jour), usage régulier d'alcool ou de cannabis (plus de 10 épisodes de consommation).

Contact presse :

OFDT : Julie-Emilie Adès / 01 41 62 77 46 / julie-emilie.ades@ofdt.fr